ОДОБРЕНО
Совет по ветеринарным препаратам
протокол от 10 января 2020 г. № 106

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата «Лимоксин-25 Спрей»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Лимоксин-25 Спрей (Limoxinum-25 Spray).

Международное непатентованное наименование: окситетрациклина гидрохлорид.

1.2 Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения.

1.3 В 1,0 мл препарата содержится в качестве действующего вещества 25 мг окситетрациклина гидрохлорида, а также вспомогательные вещества (гексагидрат хлорида магния, краситель синий V патентованный, пропиленгликоль, метанол, моноэтаноламин, изопропиловый спирт, повидон К17).

1.4 По внешнему виду препарат представляет собой раствор синего цвета.

1.5 Препарат упаковывают в алюминиевые аэрозольные флаконы (баллоны) по 200 мл.

1.6 Препарат хранят в упаковке производителя в защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

1.7 Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

1.8 Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года от даты изготовления. Препарат запрещается применять по истечении срока годности.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Окситетрациклина гидрохлорид относится к группе биосинтетических тетрациклинов и обладает бактериостатическим действием против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus (Haemophilus) spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Escherichia coli, Salmonella spp.* Не активен в отношении патогенных грибов и вирусов.

2.2 Механизм действия окситетрациклина гидрохлорида основан на подавлении синтеза белка бактерий на уровне рибосом. Окситетрациклин поступает в бактериальную клетку через энергозависимую транспортную систему, связывается с рибосомальной 30-S-субъединицей и ингибирует связывание аминоацил-тРНК с акцепторным участком в комплексе мРНК-рибосома.

2.3 При наружном применении препарата окситетрациклина гидрохлорид практически не всасывается и не накапливается в органах и тканях животного. Благодаря специально разработанному растворителю, препарат прочно фиксируется на обработанной поверхности, оказывая длительное противомикробное действие.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют крупному рогатому скоту, овцам и козам при травматических повреждениях сосков вымени, копытец, некробактериозе, ожогах, дерматитах, экземах, флегмонах, трофических язвах и постоперационных ранах.

Свиньям препарат применяют при экссудативном дерматите, травмах кожи, экземах и для обработки постоперационных ран.

Кошкам и собакам препарат применяют для обработки постоперационных и других ран, при дерматитах, ожогах, пиодерме, экземах и язвах.

3.2 Препарат распыляют на повреждённые участки кожи 1-2 раза в день с расстояния 15-20 см в течение 1-2 секунд. Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней.

3.3 У отдельных животных могут возникнуть аллергические реакции. В случае возникновения аллергических реакций (зуд кожи, одышка, беспокойство животного) препарат отменяют и назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

3.4 Не применять препарат при индивидуальной повышенной чувствительности животных к тетрациклинам; при нарушениях функции почек и печени. Не применять препарат одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами, хинолонами, фторхинолонами и циклосерином.

3.5 Продукция животного происхождения во время и после применения препарата может быть использована в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного убоя животного обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом соблюдают правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Запрещается распылять в глаза и рядом с ними.

4.3 Не поджигать и не протыкать баллон с аэрозолем.

4.4 Не подвергать воздействию температур свыше плюс 50°С.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 «Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС», Ванапере 14, Деревня Пююнси, Виймси, Харьюмаа, 74013, Эстония / «Interchemie Werken «De Adelaar» Eesti AS», Vanapere tee 14, Puunsi village, Viimsi, Harju county, 74013, Estonia.

Инструкция по применению препарата подготовлена сотрудником «Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС» (Анна Гер) и УО ВГАВМ (Иванов В.Н., Петров В.В.).