



КОПИЯ ВЕРНА



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЗападВетСервис»

Малашко А. В.

«15»августа 2023

ИНСТРУКЦИЯ

По применению кормового концентраты «Минивит»

1. Общие сведения

1.1. Минивит (Minivitum).

1.2. Минивит представляет собой комплексный минерально-витаминный кормовой концентрат в форме порошка серовато-белого цвета.

В 1,0 кг кормовой концентраты содержится: витамина А 600 000 М.Е.; витамина D3 200 000 М.Е.; витамина В1 100,0 мг; витамина В2 200,0 мг; витамина В6 10,0 мг; витамина В12 1,1 мг; витамина Е 75,0 мг; витамина К3 25,0 мг; никотиновой кислоты 1,25 г; пантотената кальция 500,0 мг; холинхлорида 25,0 г; DL-метионина 10,0 г; L-лизина 2,5 г; корня горечавки 5,0 г; карнитин гидрохлорида 10,0 г; глутамат натрия 7,5 г; хлорид натрия 25,0 г; карбонат магния 5,0 г; селенит натрия 36,5 мг; марганца (в виде сульфата) 480,0 мг; цинка (в виде сульфата) 504,0 мг; железа (в виде сульфата) 600,0 мг; меди (в виде сульфата) 125,0 мг; кобальта (в виде сульфата) 105,0 мг; йодид калия 124,0 мг; карбонат кальция 443,9 г; дикальцийфосфата 300,0 г; ароматизатора 2,5 г и наполнитель (соевая мука) до 1,0 кг.

1.3. Кормовой концентрат выпускают в фольгированных пакетах по 100,0; 500,0 г и по 1,0; 5,0 и 25,0 кг.

1.4. Хранят с предосторожностью (Список Б) в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 50С до плюс 200С.

1.5. Срок годности – 1 (один) год от даты изготовления кормовой концентраты.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Минивит обладает комплексным действием, регулирующим оптимальное соотношение витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот, поступающих в организм, способствует повышению резистентности к инфекционным агентам различного происхождения, благотворно влияет на процессы роста и развития. Оказывает благоприятное воздействие на общий тонус, улучшает аппетит и увеличивает продуктивность.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ КОНЦЕНТРАТА

3.1. Кормовой концентрат применяют крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям и птице при стрессовых состояниях, потере аппетита, голодании, при заболеваниях, вызванных недостатком витаминов и минеральных веществ, заболеваниях заразной и незаразной этиологии, замедленном развитии животных, а также в качестве тонизирующего, общеукрепляющего, стимулирующего средства.

3.2. Минивит применяют с кормом групповым методом и индивидуально. При групповом методе кормовой концентрат задают птице из расчета 20-30 кг на тонну корма в течение 10-20 дней. Крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям кормовой концентрат задают из расчета 20 кг на тонну корма в течение 10-20 дней. Для беременных самок свиней и лошадей доза кормового концентратов составляет 60-100 г в сутки в течение 15-20 дней, для поросят и жеребят - по 10-15 г в сутки в течение 15-20 дней, КРС взрослым – 100-200 г в сутки в течении 10-20 дней, телятам 30-50 г в сутки в течении 10-20 дней Продукцию, получаемую от животных и птиц после применения кормового концентрата, можно использовать без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе с кормовым концентратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

5.1. ООО «ЗападВетСервис», Республика Беларусь, 222162 Минская обл., г. Жодино, ул. Куприянова, 7А
Тел. 801775 5-35-59