ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата **Олиговит**
мультивит инъекционный

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Олиговит мультивит инъекционный (Oligovit multivit inj) - прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета со специфическим запахом, в 1 мл которого содержится 4 мг витамина Е, 50000 МЕ витамина А, витамины группы В, микроэлементы.
- 1.2. Препарат выпускают расфасованным по 100 и 250 мл во флаконы из темного стекла. Хранят в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности 2 года со дня изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА

- 2.1. Препарат обладает сложным комплексным воздействием на организм, обусловленным входящими в его состав компонентами (витаминами и микроэлементами), которые оказывают синергическое действие.
- 2.2. Витамин Е в качестве внутриклеточного антиоксиданта участвует в стабилизации жирных ненасыщенных кислот, и тем самым предотвращает образование токсичных липоперекисей, регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃, положительно влияет на иммунитет, общую сопротивляемость организма.
- 2.3. Витамин А играет важную роль в кальций-фосфорном обмене, способствует нормальному состоянию кожи, слизистых оболочек, органа зрения.
- 2.4. Витамины группы В способствуют нормальной работе нервной системы, кроветворной системы.
- 2.5. Микроэлементы (кобальт, медь, цинк, марганец, магний) имеют важное значение для нормального протекания обменных процессов в организме.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА

- 3.1. Олиговит мультивит инъекционный применяют внутримышечно для профилактики и лечения гиповитаминозов, развивающихся на фоне стрессов, беременности и лактации, нарушений обмена веществ, несбалансированности рационов кормления у сельскохозяйственных животных и птицы в следующих дозах:

Вид животных	Дозы
Взрослый крупный рогатый скот, лошади	8-25 мл препарата на одно животное (0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела животного) один раз в неделю при лечении, один раз в месяц для профилактики.
Телята, жеребята	4-10 мл препарата на одно животное (0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела животного) один раз в неделю при лечении, один раз в месяц для профилактики
Свиноматки (супоросные, лактирующие)	25 мл препарата на одно животное (0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела животного) один раз в неделю при лечении, один раз в месяц для профилактики
Свиньи на откорме	5-8 мл препарата на одно животное (0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела животного) один раз в неделю при лечении, один раз в месяц для профилактики
Поросята	1-2 мл препарата на одно животное (0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела животного) один раз в неделю при лечении, один раз в месяц для профилактики
Птица	0,1 мл препарата на одну голову внутримышечно

- 3.2. Противопоказания: не превышать указанные дозировки препарата.
- 3.3. Побочные действия: не отмечаются.

3.4. Убой животных и птицы на мясо допускается без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае несоответствия препарата указанным в настоящем наставлении требованиям, а также при выявлении осложнений, использование препарата прекращают, сообщают об этом в Государственное учреждение “Белорусский государственный ветеринарный центр“ (г. Минск, ул. Красная 19–а, тел. 290-42-79).

Одновременно направляют в адрес Белорусского государственного ветеринарного центра не менее 3-х невскрытых упаковок препарата от серии, вызвавшей осложнения. По требованию потребителя проверку образцов препарата проводит Белорусский государственный ветеринарный центр.

KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320, Hoogstraten, Бельгия

Наставление подготовлено Белорусским государственным ветеринарным центром на основании документов представленных заявителем.