

**Инструкция
по применению ветеринарного препарата
«Флорфенвет 10 %»**

1 Общие сведения

1.1 Флорфенвет 10 % (Florfenvetum 10 %).

1.2 Флорфенвет 10 % - противомикробный препарат, в 1 мл которого содержится 0,1 г флорфеникола и вспомогательные вещества: пропиленгликоль, поливинилпирролидон.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

1.3 Препарат выпускают по 100, 200, 1000 и 5000 мл в таре полимерной непрозрачной с завинчивающейся крышкой.

1.4 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С в упаковке предприятия-изготовителя.

1.5 Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

2 Фармакологические свойства.

2.1 Флорфеникол - синтетический антибиотик, относящийся к производным тиамфеникола. Обладает бактериостатическим действием, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе: *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Fusobacterium necrophorum* и др.

Механизм действия связан с блокированием фермента пептидилтрансферазы, что приводит к торможению синтеза белка у чувствительных к антибиотику микроорганизмов на уровне рибосом.

2.2 Флорфеникол хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, быстро распределяется в организме, проникая во все органы и ткани. Биодоступность у свиней составляет около 88 %. Максимальная концентрация антибиотика в сыворотке крови достигается через 1-1,5 часа и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 24 часов после применения лекарственного средства.

Препарат частично метаболизируется в печени, выводится из организма преимущественно с мочой и частично с фекалиями в неизменном виде и в виде метаболитов.

3 Порядок применения препарата.

3.1 Флорфенвет 10 % применяют свиньям и птице в качестве терапевтического средства при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии: гемофилезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, пастереллезе и других заболеваниях, вызванных чувствительными к флорфениколу микроорганизмами.

3.2 Препарат назначают перорально индивидуально или групповым способом с питьевой водой. Необходимую дозу флорфенвета 10 % растворяют предварительно в небольшом количестве воды (прибавляя воду к препарату, а не наоборот), а затем полученный раствор разбавляют водой до необходимой концентрации. Поилки следует ставить в местах, защищенных от прямого солнечного света. Раствор готовится ежедневно.

Флорфенвет 10 % применяют в следующих дозах:

- цыплятам в возрасте до 4-х недель – в суточной дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы, что соответствует 100 мл препарата на 100 л воды в течение 3 дней;

- другим возрастным категориям птицы – 200 мл препарата на 100 л воды в течение 3 дней, а при сальмонеллезе – в течение 5 дней;

- свиньям – в суточной дозе 5 мг флорфеникола на 1 кг массы тела животного, что соответствует 5 мл препарата на 100 кг массы тела животного, в течение 7 дней.

3.3 В рекомендуемых дозах препарат, как правило, не вызывает осложнений. Не рекомендуется его применять при повышенной индивидуальной чувствительности животных и птицы к флорфениколу. В случае передозировки возможно уменьшение потребления корма и воды, снижение привесов, у свиней – перianальная эритема и отек. Указанные симптомы самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

3.4 Запрещено применять препарат супоросным свиноматкам. Не применять животным, которые имеют повышенную чувствительность к флорфениколу, а также с выраженной почечной и печеночной недостаточностью.

Флорфенвет 10 % запрещен к применению для птицы, чье яйцо используется в пищу людям.

3.5 Препарат не следует применять с хлорамфениколом и тиамфениколом, антибиотиками группы пенициллинов, цефалоспоринов, фторхинолонов в виду возможного возникновения побочных явлений и осложнений.

3.6 Убой свиней на мясо допускает не ранее, чем через 14 суток, птицы - не ранее, чем через 6 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, могут быть использованы для кормления плотоядных животных.

4 Меры личной профилактики

4.1 Во время применения препарата следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

5 Порядок предъявлений рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы препарата из вызвавшей осложнение серии в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний. Составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, д. 19А, тел.: 290-42-75) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 Полное наименование изготовителя

6.1 Производственное унитарное предприятие «Гомельский завод ветеринарных препаратов», Республика Беларусь, 246013, г. Гомель, пер. Технический, д. 1, по заказу Частного торгового унитарного предприятия «Биоветпром», Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Королищевичи, ул. Коммунистическая, 41 а, к. 1-1.

Инструкция разработана сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» Кучинским М.П. и Частного предприятия «Биоветпром» Каменским Г.И.

