

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
Протокол № 105 от 09.01.2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного препарата «Колиприм 24%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Колиприм 24% (Coliprimum 24%).
- 1.2 Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, легко растворим в воде.
- 1.3 Состав препарата в 1,0 г:
Колистина сульфата 2400000 МЕ
Наполнитель: декстроза моногидрат
- 1.4 Препарат выпускают по 50 г, 100 г, 250 г, 500 г, 1000 г в пакетах многослойных из полимерной металлизированной пленки.
- 1.5 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 5⁰С до плюс 25⁰С.
- 1.6 Срок годности 2 (два) года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения, 2 месяца после первого вскрытия упаковки. Не применять по истечении срока годности препарата.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Колистина сульфат, входящий в состав препарата – полипептидный антибиотик из группы полимиксинов. Механизм действия колистина сульфата заключается в нарушении целостности цитоплазматической мембраны микробной клетки. Являясь катионным поверхностно-активным веществом, он разрушает фосфолипиды мембран микробной клетки и таким образом повышает проницаемость клеточных мембран бактерий, что приводит к их гибели.

Препарат активен против большинства грамотрицательных бактерий, в том числе *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp. Не активен против грамположительных бактерий.

2.2 Колистина сульфат ограниченно всасывается из желудочно-кишечного тракта и оказывает местное антибактериальное действие. Из организма выводится с фекалиями.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Колиприм 24% применяют для лечения свиней и сельскохозяйственной птицы при инфекционных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к колистину сульфату.

3.2 Колиприм 24% назначают птице и свиньям внутрь с питьевой водой или кормом ежедневно в течение 5-7 дней.

Птице доза препарата составляет 6 мг колистина сульфата (120 МЕ) на 1 кг массы тела, 0,25 – 0,4 г препарата на 1 литр воды или 0,8 г препарата на 1 кг корма. Птице до 4-х недельного возраста доза 0,25–0,3 г препарата, старше 4-х недельного возраста 0,3–0,4 г препарата на 1 л воды.

Свиньям препарат применяют в дозе 6 мг колистина сульфата (100 МЕ) на 1 кг массы тела, 0,35–0,45 г препарата на 1 л воды или 1 г препарата на 1 кг корма. Свиньям массой до 50 кг доза составляет 0,35 г препарата на 1 л воды, свиньям массой выше 50 кг – 0,45 г препарата на 1 л воды.

Перед применением с водой колиприм 24% растворяют предварительно в небольшом количестве воды, добавляя воду к препарату, а затем приготовленный раствор разбавляют водой до необходимой концентрации. Ежедневно готовят свежий раствор.

3.3 Не следует назначать препарат животным, у которых имеется повышенная чувствительность к антибиотикам из группы полипептидов (бацилillin, полимиксин).

3.4 В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют, назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

3.5 Убой животных и птицы на мясо разрешен не ранее, чем 7 суток после последнего применения препарата. Яйцо можно использовать в пищу людям без ограничения.

3.6 В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока, мясо используют на корм плотоядных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры гигиены и техники безопасности.

4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная 19^а, для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО "ЗападВетСервис" (РБ, Минская обл. г. Жодино ул.Куприянова 7А) для ИООО «ТерраВет» (220072, г. Минск, ул. П. Бровки 15-501).

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Н.Г., Толкачем, В.В. Петровым и И.А. Ятусевичем).

Департамент ветеринарного и продовольственного	
надзора Министерства сельского хозяйства и	
продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	<i>[Подпись]</i>
Секретарь	<i>[Подпись]</i>
Эксперт	<i>[Подпись]</i>
«9» 01 2010, протокол № 105	