

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Кокцирила 0,5% для профилактики кокцидиоза у цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур

(организация – разработчик «HUPERHARMA» AD, Болгария)

Торговое наименование лекарственного препарата: Кокцирил® 0,5% (Coxiril® 0,5%).
Международное непатентованное наименование: диклазурил.

Лекарственная форма: микрогранулированный порошок для орального применения.

Состав: диклазурил – 5,0 мг, а также вспомогательные вещества .

По внешнему виду представляет собой микрогранулированный порошок от желто-коричневого до коричневого цвета.

Форма выпуска: Кокцирил® 0,5% выпускают расфасованным по 20 кг и 25 кг .

Условия хранения: хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности: 3 года с даты производства.

Хранить в местах, недоступных для детей.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Кокцирил® 0,5% относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы бензенацетонитрилов.

Входящий в состав лекарственного препарата диклазурил, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия, эффективен в отношении всех внутриклеточных стадий цикла развития кокцидий (эймерий), паразитирующих у сельскохозяйственных птиц, включая *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. mivati* , *E. maxima*, *E. brunetti*.

Механизм действия диклазурила заключается в нарушении процессов внутриклеточного метаболизма в клетке паразита, что приводит к гибели кокцидий. При пероральном применении препарата диклазурил практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и проявляет свое антикокцидийное действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника. Выводится из организма птиц преимущественно в неизмененном виде с пометом.

По степени воздействия на организм Кокцирил® 0,5% относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ: . Кокцирил® 0,5% назначают цыплятам–бройлерам и ремонтному молодняку кур с целью профилактики кокцидиоза.

Запрещается применение Кокцирила 0,5% курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, в связи с накоплением препарата в яйцах, а также животным других видов.

Кокцирил® 0,5% применяют птице в смеси с кормом в дозе 200 г на 1 тонну корма (1 г диклазурила на 1 тонну корма):

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни в течение всего периода выращивания;
- ремонтному молодняку кур с первого дня жизни до 16-недельного возраста.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу лекарственного препарата тщательно смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем вносят при тщательном перемешивании в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

Симптомы передозировки Кокцирила® 0,5% у птиц не выявлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата необходимо возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.

При применении Кокцирила 0,5% в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается.

Кокцирил® 0,5% совместим со всеми известными лекарственными средствами и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве.

Убой птиц и использование в пищевых целях мяса при применении Кокцирила® 0,5% в соответствии с настоящей инструкцией разрешается без ограничений.

Организация-производитель АО «Биовет» «Biovet» AD; Болгария, 4550, г. Пештера, ул. Петра Ракова, 39.

Адрес представительства АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москва: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр., 19.