



КОПИЯ ВЕРНА

1.19

ОДОБРЕНО
Совет по ветеринарным препаратам
протокол № 105 от 09.01.2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата «Терокс 5%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Терокс 5% (Тегохим 5%).
- 1.2 Терокс 5% представляет собой суспензию от белого до желтого цвета.
- 1.3 Состав препарата в 1,0 мл: толтразурила 50 мг
Вспомогательные вещества: натрия пропионат, натрия бензоат, бентонит, пропиленгликоль, очищенная вода.
- 1.4 Терокс 5% выпускают по 100 мл, 250 мл и 1000 мл в пластиковых флаконах.
- 1.5 Препарат хранят по списку Б, в сухом, защищенном от свету месте при температуре от плюс 5°C до плюс 25°C.
- 1.6 Срок годности препарата 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Толтразурил относится к производным триазинтриона, активен в отношении рода *Isospora* и других видов эймериид, паразитирующих у свиней на стадиях их внутриклеточного развития.
- 2.2 Механизм действия препарата основан на блокировании дыхательных ферментов эймерий, находящихся на слизистой и подслизистой оболочках кишечника животных.
- 2.3 В организме толтразурил метаболизируется путем сульфокисления и гидроксирования, с образованием производных сульфоксида и сульфона.
- 2.4 Препарат выводится из организма главным образом с желчью и частично с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Терокс 5% применяют для лечения и профилактики эймериоза и изоспороза у поросят.
- 3.2 Назначают перорально индивидуально однократно в следующих дозах:
— поросятам на 3-5 день жизни в дозе 20 мг толтразурила на 1 кг массы животного, что соответствует 0,4 мл суспензии на 1 кг массы животного, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное.
Перед применением емкость с суспензией следует тщательно взболтать.
- 3.3 Побочное действие. Побочных явлений и осложнений у поросят при применении терокса 5% в рекомендуемых дозах, как правило, не наблюдается.
- 3.4 Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91 сутки после применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1 При использовании препарата «Терокс 5%» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными

препаратами. Необходимо избегать его прямого контакта с кожей, защищая руки резиновыми перчатками.

4.2 Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.

4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть водой с мылом, рот прополоскать водой.

4.4 Хранят препарат в недоступном для детей месте. Пустые флаконы из-под лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» г. Минск, ул. Красная 19^а, для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО "ЗападВетСервис" Минская обл. г. Жодино ул.Куприянова 7А.РБ.
для ИООО «ТерраВет» 220072 г. Минск ул. П. Бровки 15-501

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского" (М.П. Кучинский, А.Н. Безбородкин) и ИООО «Терравет» (А.Зондовас).



КОПИЯ ВЕРНА

Департамент ветеринарии и эпизоотического благополучия на территории Минской области Республики Беларусь Служба по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Президент	<i>[Signature]</i>
Секретарь	<i>[Signature]</i>
Заместитель	<i>[Signature]</i>
№ 9	протокол № 105