

Одобрено на заседании Ветбиофармсовета  
Министерства сельского хозяйства и про-  
довольствия Республики Беларусь  
Протокол № 65 «16» января 2013 г.

## Инструкция по применению препарата Мастисан - А

### 1 Общие сведения

1.1 Мастисан - А (Mastisanum - А).

1.2 Мастисан - А - комплексный препарат, содержащий в своем составе бензилпенициллин, стрептомицин, сульфадимидин, воск пчелиный, суспензированные в растительном масле.

1 доза (5 мл) – содержит:

бензилпенициллина натриевой соли	110 000 ЕД
стрептомицина сульфата	110 000 ЕД
сульфадимидина	0,35 г
основы	до 5 мл

1.3 Мастисан - А - маслянистая, гомогенная суспензия, от белого до кремового цвета, расслаивающаяся при хранении.

1.4 Выпускают по 100,0 и 200,0 мл в стеклянных флаконах, бутылках. Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше плюс 20° С.

Срок годности препарата - 18 месяцев при соблюдении условий хранения.

### 2 Фармакологические свойства

2.1 Мастисан - А обладает широким антибактериальным спектром действия, подавляет рост и развитие стрептококков, стафилококков и других патогенных микроорганизмов.

### 3 Порядок применения препарата

3.1 Применяют для лечения различных форм воспалений вымени, травматических повреждений кожи вымени и сосков.

Перед введением препарата из больной четверти вымени выдаивают молоко, а сосок дезинфицируют. Содержимое флакона подогревают до 36 - 39°С, тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси и вводят в большую четверть вымени через сосковый канал с помощью эластичного пластмассового катетера, который надевают на канюлю шприца. После введения препарата сосок пораженной четверти вымени слегка массируют снизу вверх.

Препарат вводят в зависимости от тяжести заболевания от 5 до 20 мл. Введение препарата при необходимости повторяют через каждые 24 ч до полного исчезновения признаков воспаления.

3.2 Побочные действия. В редких случаях наблюдаются аллергические реакции.

3.3 Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

3.4 Во время лечения молоко из больных четвертей выдаивают в отдельную посуду, обеззараживают и уничтожают. Молоко из остальных четвертей вымени после кипячения скармливают животным.

Молоко из четвертей вымени, подвергавшихся лечению Мастисаном-А, используют в пищу людям через 3 суток после последнего введения препарата при условии полного исчезновения клинических признаков мастита (приобретения нормальных свойств молока по цветной реакции и пробе отстаивания).

Мясо животных, убитых в период лечения, используют без ограничения, за исключением вымени, которое бракуют.

#### 4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

4.2 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

#### 5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

#### 6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ". (Республика Беларусь). 220000, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, к.1016 а.

Инструкция по применению разработана сотрудниками ООО "ТМ" (Кривко В.Г.).

